

## RIPA 裂解液(弱, 无抑制剂)

**【货号】** BI-WB008

**【规格】** 100mL

**【保存】** -20℃, 12 个月

### 【产品简介】

RIPA 裂解液(弱, 无抑制剂)是一种常用的细胞组织快速裂解液, 主要成分为 50mM Tris(pH7.4), 150mM NaCl, 1% NP-40, 0.25% 脱氧胆酸钠, 不含蛋白酶、磷酸酯酶等抑制剂。RIPA 裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的 Western、IP 和 ELISA 等。

使用本裂解液时, 用户可以根据具体用途自行添加特定抑制剂。

### 【使用方法】

对于培养细胞样品:

1、融解 RIPA 裂解液, 混匀。取适当量的裂解液, 根据需要自行确定添加适当的抑制剂或不添加抑制剂。

2、对于贴壁细胞: 去除培养液, 用 PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍。按照 6 孔板每孔加入 150~250 $\mu$ L 裂解液的比例加入裂解液。用枪吹打数下, 使裂解液和细胞充分接触。

对于悬浮细胞: 离心收集细胞, 用手指把细胞用力弹散。按照 6 孔板每孔细胞加入 150~250 $\mu$ L 裂解液的比例加入裂解液。再用手指轻弹以充分裂解细胞。充分裂解后应没有明显的细胞沉淀。如果细胞量较多, 必需分装成 50~100 万细胞/管, 然后再裂解。

3、充分裂解后, 10000~14000g 离心 3~5min, 取上清, 即可进行后续的 PAGE、Western 和免疫沉淀等操作。裂解液用量说明: 通常 6 孔板每孔细胞加入 150 $\mu$ L 裂解液即可, 但如果细胞密度非常高可以适当加量到 200 $\mu$ L 或 250 $\mu$ L。每 100 万细胞用 100 $\mu$ L 本产品裂解后获得的上清, 其蛋白浓度约为 2~4mg/ml, 不同细胞有所不同。

对于组织样品:

1、把组织剪切成细小的碎片。

2、融解 RIPA 裂解液, 混匀。取适当量的裂解液, 根据需要自行确定添加适当的抑制剂或不添加抑制剂。

3、按照每 20mg 组织加入 150~250 $\mu$ L 裂解液的比例加入裂解液。(如果裂解不充分可以适当添加更多的裂解液, 如果需要高浓度的蛋白样品, 可以适当减少裂解液的用量。)

4、用玻璃匀浆器匀浆, 直至充分裂解。

5、充分裂解后, 10000~14000g 离心 3~5min, 取上清, 即可进行后续的 PAGE、Western 和免疫沉淀等操作。每 20mg 冻存的小鼠肝脏组织用 200 $\mu$ L 本裂解液裂解后获得的上清, 其蛋白浓度约为 15~25mg/ml, 不同状态的不同组织有所不同。

6、如果组织样品本身非常细小, 可以适当剪切后直接加入裂解液裂解, 通过强烈 vortex 使样品裂解充分。然后同样离心取上清, 用于后续实验。直接裂解的优点是比较方便, 不必使用匀浆器, 缺点是不如使用匀浆器那样裂解得比较充分。

### 【注意事项】

- 1、如需添加蛋白酶抑制剂等, 需自行准备。
- 2、裂解样品的所有步骤都需在冰上或 4 $^{\circ}$ C 进行。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。